

アレルギー性鼻炎で使用される点鼻薬比較表

先発名	成分名	分類	回数/本	用法用量	小児用量	初回 空打ち回数	備考特徴	市販薬
インタール点鼻液(販売中止) GEのみ販売	クロモグリク酸Na	抗アレルギー	60回分	1回各鼻腔1噴霧 1日6回		霧状になるまで	3ヵ月以内の妊婦禁忌	エージーノーズアレルギーカットG,M エメロットALGプラス など
ザジテン点鼻液 GEあり	ケチフェン	抗ヒスタミン	56回分	1回各鼻腔1噴霧 1日4回		5回	自動車運転禁止	ザジテンAL鼻炎スプレーα ザジテンAL鼻炎スプレーαクール パブロン点鼻クイック など
リボステン点鼻液 GEなし	レボカバステン	抗ヒスタミン	112回分	1回各鼻腔2噴霧 1日4回		4回	自動車運転禁止	なし
アラミスト点鼻液 GEあり	フルチカゾン フランカルボン酸エス テル	ステロイド	56回分 120回分	1回各鼻腔2噴霧 1日1回	1回各鼻腔1噴霧 1日1回 (2歳以上が目安)	6回	目の症状にも効果ありとの報告 液だれしにくい	なし
エリザス点鼻粉末 GEなし	デキサメタゾン シベシル酸エステル	ステロイド	28回分	1回各鼻腔1噴霧 1日1回		なし	刺激が少ない 使用感○(ゆえに使用しているか不 安になるケースもある) 作用発現に1週間程度	なし
ナゾネックス点鼻液 GEあり	モメタゾン フランカルボン酸エス テル	ステロイド	56回分 112回分	1回各鼻腔2噴霧 1日1回	<12歳未満> 1回各鼻腔1噴霧 1日1回 (3歳以上が目安)	10回	特異なにおいあり ベンザルコニウム含有	なし
フルナーゼ点鼻液 小児用フルナーゼ点鼻液 双方GEあり	フルチカゾン プロピオン酸エステル	ステロイド	28回分 56回分	<フルナーゼ点鼻液> 1回各鼻腔1噴霧 1日2回 MAX:8噴霧まで/日	<小児用フルナーゼ点鼻液> 1回各鼻腔1噴霧 1日2回 MAX:8噴霧まで/日 (5歳以上が目安)	7回	特異なにおい(バラの香り)あり 作用発現に数日	フルナーゼ点鼻液(スイッチOTC)
リノコート点鼻液(販売中止) GEのみ販売(パウダータイプあり)	ベクロメタゾン プロピオン酸エステル	ステロイド	<点鼻液> 約80回分 <鼻用パウ ダー> 60回分	<点鼻液> 1回各鼻腔1噴霧 1日4回 MAX:16噴霧まで/日 <パウダー> 1回各鼻腔1噴霧 1日2回 朝・夜 適宜増減あり	<点鼻液> 1回各鼻腔1噴霧 1日2回 MAX:8噴霧まで/日 (6歳以上が目安) <パウダー> (6歳以上が目安)	<点鼻液> 5~10回(霧状に出 るまで) <パウダー> なし	粉末の感覚あり	エメロットST点鼻液 ST点鼻薬クールプラス アスピー点鼻液EXa エージーアレルギーカットEXc ナザールαAR など

ミスト(点鼻液)タイプは鼻水が多い場合は薬剤が流れやすい。
 パウダータイプは鼻の通りがひどい場合は患部に届きにくい。
 噴霧する前はよく鼻をかんで、鼻の通りをよくしてから使用する。