成分名	先発品	後発品	Tmax	半減期	用法用量	追加投与間隔	
スマトリプタン	イミグラン錠50	スマトリプタン錠50mg「各メーカー」 スマトリプタン内用液50mg「タカタ」	2h	2.2h	1回50mg MAX200mg/日	2 時間以上	
	イミグラン点鼻薬20	鼻粘膜より吸収し10分後に第一ピーク 消化管からの吸収で第二ピーク →	10m 1.3h	1.8h	1回20mg MAX40mg/日		
	イミグランキット皮下注3mg		10m	1.7h	1回3mg MAX6mg/日	1時間以上	
ゾルミトリプタン	ゾーミッグ錠2.5mg		3h	2.4h	1回2.5mg	2 時間以上	
	ゾーミッグ錠RM2.5㎜	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「各メーカー」		2.9h	MAX10mg/ ⊟		
エレトリプタン	レルパックス錠20mg	エレトリプタン錠20㎡「各メーカー」	1h	3.2h	1回20mg MAX40mg/日	2 時間以上	
リザトリプタン	マクサルト錠10mg		1h	1.6h	1回10mg MAX20mg/日	2 時間以上	
	マクサルトRPD錠10噸	リザトリプタンOD錠10㎏「各メーカー」	1.3h	1.7h			
ナラトリプタン	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン錠2.5㎏「KO」	2.7h	5h	1回2.5mg MAX5mg/日	4時間以上	

○痛みの出初めに早めに服 用することで痛みを抑える効 果がよい。

○1か月に10回以上服用してしまう場合はトリプタン乱用頭痛を引き起こす可能性があるので、そんな場合は片頭痛予防薬の検討。

成分名	特徴	重度の 肝障害	重度 の 腎障害	併用注意禁忌薬	共通禁忌	
スマトリプタン (イミグラン)	・剤型が豊富で点鼻薬や皮下注があるので、吐気が強く、経口が厳しい場合は選択肢に入る ・MAX量が通常量の4倍までと調節性がある(錠)	×	_	【禁忌】MAO阻害剤 (エフピー、アジレクト、エクフィナ等)		
ゾルミトリプタン (ゾーミッグ)	 ・重度の肝機能障害患者やCYP1A2阻害剤を服用している患者には 5mg/日に抑えて慎重に投与 ・Tmaxが1hと立ち上がりが早い 			【注意】CYP1A2阻害剤 【禁忌】MAO阻害剤 (エフピー、アジレクト、エクフィナ等)	・成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ・心筋梗塞の既往歴のある患者、虚血性心疾 患又はその症状・兆候のある患者、異型狭心 症(冠動脈攣縮)のある患者 ・脳血管障害や一過性脳虚血性発作の既往の ある患者 末梢血管障害を有する患者 ・コントロールされていない高血圧症の患者	
エレトリプタン (レルパックス)			I —	【注意】CYP3A4阻害・誘導剤 【禁忌】HIVプロテアーゼ阻害剤		
リザトリプタン (マクサルト)	-RPD錠剤はGEのOD錠は水なしで服用できる・相互作用が少ない	×	×	【禁忌】MAO阻害剤 (エフピー、アジレクト、エクフィナ等) ・プロプラノロール	・エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、 あるいは他の5-HT1B/1D受容体作動薬を投与 中の患者	
ナラトリプタン (アマージ)	・半減期が5hと長いので、何度も頭痛を再発する方に向いている・相互作用が少ない・肝機能障害患者または腎機能障害患者には2.5mg/日とすること	×	×	_		